

Desafíos diagnósticos en enfermedades **cardiovasculares de origen hereditario**

Dr. Luis Enrique Gómez

Hospital de Agudos "Juan A. Fernández"





Agenda para hoy

Temario


- Enfermedades cardiovasculares hereditarias
- Tipos de ECH
- Arritmias Hereditarias
- Miocardiopatías
- Mensajes finales



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES **HEREDITARIAS**

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA

vs



Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES **HEREDITARIAS**

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA

ABEBE BIKILA. ROMA 1960



SHERPA



YAK



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES **HEREDITARIAS**

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA

ABEBE BIKILA. ROMA 1960



SHERPA



NO SHERPA







VACA



YAK



BEKOJI ESTÁ A 2.800
METROS



Gupta ML. Lack of smooth muscle in the small pulmonary arteries of the native Ladakhi. Is the Himalayan highlander adapted? Am Rev Respir Dis 145: 1201–1204, 1992

Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez




“Lo que natura no da **Salamanca non presta**”.

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA


ABEBE E



BEKOJI ESTÁ A
METROS



YAK




pulmonary arteries of the native Ladakhi. Is
Rev Respir Dis 145: 1201–1204, 1992



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES **HEREDITARIAS**

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



1 error cada 100 millones de nucleótidos. Tasa de error $1,3 \times 10^{-8}$

Kong A. Nature 2012;488:471-475.

Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez



Características ECH

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



Presentación familiar

- Evaluar a los miembros de la familia si una persona está afectada.
- Posibilidad de variante genética heredada.



Base genética

- Diagnóstico genético posible, aunque no siempre se identifica la variante causal.
- Aumento en la identificación de nuevas variantes.
- Considerar penetrancia incompleta y expresividad variable de los cambios génicos.





Muerte súbita

- En ocasiones como forma de presentación de la enfermedad.
- Son causa frecuente en menores de 35 años sean deportistas o no



Herencia **y Riesgo**














Muerte súbita cardíaca








Etiología MSC

Grupos etarios

KATJA ZEPPENFELD, ET AL, 2022 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH: .EUROPEAN HEART JOURNAL, VOLUME 43, ISSUE 40, 21 OCTOBER 2022, PAGES 3997–4126




ARRITMIAS PRIMARIAS
MIOCARDIOPATÍAS
MIOCARDITIS
ANOMALÍAS CORONARIAS

CPVT
LQT
ARVC

KATJA ZEPPENFELD, ET AL, 2022 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH: .EUROPEAN HEART JOURNAL, VOLUME 43, ISSUE 40, 21 OCTOBER 2022, PAGES 3997–4126







BRS
HCM
DCM
ARVC
SCA


KATJA ZEPPENFELD, ET AL, 2022 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH: .EUROPEAN HEART JOURNAL, VOLUME 43, ISSUE 40, 21 OCTOBER 2022, PAGES 3997–4126





KATJA ZEPPENFELD, ET AL, 2022 ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND THE PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH: .EUROPEAN HEART JOURNAL, VOLUME 43, ISSUE 40, 21 OCTOBER 2022, PAGES 3997–4126





Arritmias de origen hereditario



Qt Largo

PATRONES DE HERENCIA


AD 1/2000 ROMANO-WARD

AR 1/4000000 JERVELL LANGE NIELSEN

MORTALIDAD




SINTOMATICOS



↓ Corriente de Potasio


Canal Potasio



Lento	Rapido
Kv7.1 (Iks)	Kv11,1 (Ikr)
KCNQ1 Sub α	KCNH2 Sub α
Variantes con Pérdida de Función 80%*	

Persistencia de la corriente de Sodio

Canal Sodio



SCN5A
Variantes con Ganancia de Función*

*Schwartz PJ, Crotti L, Insolia R. Long-QT syndrome: from genetics to management. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012 Aug 1;5(4):868-77



Qt Pretest

Presentacion Clinica		
Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
		
Estrés Emocional		
		
Historia Fliar, Síntomas. ECG Holter Ergometria Imagenes		



Confirmacion manual de la duración
 $QTc \geq 480 \text{ mseg} \uparrow \geq \uparrow 470 \text{ mseg}$
 (excluir U, formula Bazet, evaluar anomalías onda T)

PT.Score de riesgo
QTL*

**QTC ≥ 500
mseg**

≤ 1 1,5-3 ≥ 3,5


Test Provocación**

*Schwartz score
 **Test provocación,
 ergometría, pararse
 abruptamente, Epinefrina,
 estrés aritmetico

Clase I

**Test
Genético**

Test Genético



Vink AS, et al.Circulation. 2018;138:2345–2358.

Long QT syndrome


Impact of genetic testing for the index case


Disease	Diagnostic	Prognostic	Therapeutic
LQTS	+++	+++	+++

Europace (2022) 24, 1307–1367















GEN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO DE AMINOÁCIDO	CIGOSIDAD	CLASIFICACIÓN ACMG
KCNH2	c.1814C>A (NM_000238.4)	p.(Pro605His)	Heterocigota	Posiblemente Patogénica






■ Long QT syndrome
Clinically affected

■ Long QT syndrome
Not affected

E1 KCNH2 (g.150648667G>T, c.1814C>A, p.Pro605His)
"+/+" = Homozygous, "-/+" = Heterozygous, "+" = Hemizygous, "-/-" = Not found, "-/" = Not found



BETABLOQUEANTES





SINCOPE
ECG NORMAL






Goldenberg I et al. Risk for life-threatening cardiac events in patients with genotype-confirmed long-QT syndrome and normal-range corrected QT intervals. J Am Coll Cardiol. 2011;57:51–9.







GEN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO DE AMINOÁCIDO	CIGOSIDAD	CLASIFICACIÓN ACMG
KCNQ1	c.535G>A (NM_000218.3)	p.Gly179Ser	Heterocigota	Patogénica




III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA

BETABLOQUEANTES







Dilated cardiomyopathy



Hypertrophic cardiomyopathy



Arrhythmogenic cardiomyopathy




Restrictive cardiomyopathy


Miocardio^{patías}



Fenotipos solapados









Miocardiopatía Hipertrofica

Prevalencia:

0.029%

Arola A, et al. Am J Epidemiol. 1997 Sep
1;146(5):385-93.



Semsarian, C. et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 65(12):1249-54.




Miocardiopatía Hipertrofica

Prevalencia:

0.029%

Arola A, et al. Am J Epidemiol. 1997 Sep
1;146(5):385-93.


Inicio: 15%



0.2


1:500 (0.2%)
(4) Γ A
%

Current HCM Prevalence



Semsarian, C. et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 65(12):1249-54.







Espesor parietal en uno o mas segmentos miocardicos



≥ 15 mm



Z-score ≥ 2.5




≥ 13 mm


Z-score ≥ 2



Ausencia otras causas de engrosamiento parietal, sistémicas, sindrómicas o metabólicas.



Ausencia otras causas de engrosamiento parietal, sistémicas, sindrómicas o metabólicas.



BITGENIA
TRANSCENDING
GENOMICS

RESULTADOS

Se informa una variante **Patogénica** en el gen **PTPN11** asociado con Síndrome de Noonan, Síndrome de Noonan con múltiples lentigos y Metacondromatosis, todos de herencia autosómica dominante.

PTPN11 NM_002834.5							
POSICIÓN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO EN LA PROTEÍNA	EFEECTO	GENOTIPO	PROF.	INFO EXTERNA	CLASIFICACIÓN ACMG
12:112489068	C > T c.1492C>T	p.(Arg498Trp)	Missense Variant	HET	51/123	rs397507541	5

5

 Patogénica



4

 Probablemente Patogénica

3









 Significado incierto (VUS)





MCH y?

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA








Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez



MCH y genética

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



PLOF








Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez




A portrait of a man with short brown hair, looking slightly to the right. He is wearing a green sports jersey with yellow trim and a logo on the chest. The background is blurred.

PLOF





Genética, organicemos chango



REDITO DIAGNOSTICO

Dosage Sensitivity			
Gene	Disease	Working Group	HI Score & TS Score
MYH7		Dosage Sensitivity WG	0 (No Evidence for Haploinsufficiency) 0 (No Evidence for Triplosensitivity)

Dosage Sensitivity			
Gene	Disease	Working Group	HI Score & TS Score
MYBPC3	hypertrophic cardiomyopathy 4 MONDO:0007268	Dosage Sensitivity WG	3 (Sufficient Evidence for Haploinsufficiency)
MYBPC3		Dosage Sensitivity WG	0 (No Evidence for Triplosensitivity)




MYH7 Y MYBPC3




Genética, organismos change

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA




REDITO DIAGNOSTICO



MYH7 Y MYBPC3





<u>POPULATION EVIDENCE (POP)</u>
POP_FRQ Population Freq.

<u>CLINICAL EVIDENCE (CLN)</u>
CLN_CCR Case:control ratio
CLN_COB Case observation counts
CLN_LNK Linkage
CLN_PHE Specific Phenotype
CLN_DNV De novo


<u>MOLECULAR IMPACT EVIDENCE (IMP)</u>
IMP_NMD Predicted to undergo NMD
IMP_CDS Impact to coding sequence
IMP_MSS Missense variants
IMP_SYN Synonymous
IMP_INF In-frame delins
IMP_SPL Splicing assessment
IMP_FXN Variant-specific Funct Assays



Al final del día...



III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



Sarcomero

MYBPC3,MYH7,TPM1,TNNT2,ACTC1,MYL2,MYL3,TNNC1

Otros monogenicos

FHOD3,KLHL24,TRIM63,CSRP3,PLN,ACTN2,JPH2,MT-TI

Sindromico

Rasopatias: PTPN11, RAF1, RIT1
Danon: LAMP2
Fabry: GLA
Amiloidosis: TTR
Emery Dreifuss: FHL1
Miopatia miofibrilar: FLNC
Desminopatia: DES
PRKAG2: PRKAG2


Sme. Timothy: CACNA1C

Poligenico

Hespe S, Waddell A, Ingles J. ClinGen Hereditary Cardiovascular Disease Gene Curation Expert Panel: Reappraisal of Genes associated with Hypertrophic Cardiomyopathy. medRxiv [Preprint]. 2024 Jul 31:2024.07.29.24311195.

Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez





30 Años.

Apto físico


Antecedentes fliares

desconoce

Sintomas

asintomatico





Ecodoppler

Diagnostico

Miocardiopatía Hipertrofica Septal

Asimétrica no obstructiva





Estudio genético




Se informa una variante **Patogénica** en el gen **MYBPC3** asociado con Cardiomiopatía Hipertrófica (autosómico dominante/ autosómico recesivo) y Cardiomiopatía Dilatada (autosómico dominante).

MYBPC3NM_000256.3							
POSICIÓN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO EN LA PROTEÍNA	EFFECTO	GENOTIPO	PROF.	INFO EXTERNA	CLASIFICACIÓN ACMG
11:47339792	T>C c.1928-2A>G	p.(?)	Splice Acceptor Variant	HET	50/107	rs397515937	5

5 Patogénica 4 Probablemente Patogénica 3 Significado incierto (VUS)





36 Años.


Colega
Antecedentes fliares

Madre MCH

Sintomas

Disnea esfuerzo





36 Años.

Control

Antecedentes fliares

Madre MCH

Sintomas

Disnea esfuerzo



Estudio genético







RESULT: POSITIVE

One Pathogenic variant identified in MYBPC3. MYBPC3 is associated with a spectrum of autosomal dominant cardiomyopathy conditions.

GENE	VARIANT	ZYGOSITY	VARIANT CLASSIFICATION
MYBPC3	c.2670G>A (p.Trp890*)	heterozygous	PATHOGENIC
GAA	c.2065G>A (p.Glu689Lys)	heterozygous	Benign (Pseudodeficiency allele)

About this test
This diagnostic test evaluates 157 gene(s) for variants (genetic changes) that are associated with genetic disorders. Diagnostic genetic testing, when combined with family history and other medical results, may provide information to clarify individual risk, support a clinical diagnosis, and assist with the development of a personalized treatment and management strategy.






LPM:
FC: 57 LPM

Intervalos:
Ancho QRS: 96 ms
Ancho P: 152 ms
RR: 1056 ms
Intervalo QT: 467 ms
Intervalo QTc: 455 ms

Segmento PR:
PR seg: 60 ms
PR int: 212 ms

Segmento ST:
Intervalo ST: 96 ms
J0 : 0.029 mV
J20: -0.084 mV
J60: -0.089 mV
J80: -0.089 mV
Elev ST: -0.058 mV
Pend ST: -004.6 uV/ms

Eje electrico: 50°



38Años.



MDQ
Antecedentes fliares

MCH/CDI

Sintomas

Disnea





**MCH septal
asimetrica**
**Septo-inverti
do**



Estudio genético



GEN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO DE AMINOÁCIDO	CIGOSIDAD	CLASIFICACIÓN ACMG
MYBC3	c.362del (NM_000256.3)	p.Pro121Argfs*38	Heterocigota	Patogénica


MYBPC3:c.362del

ProAlaProAla

C T G G G G C C G G G G C

CHR11-47372096 CG>C

p.Pro121Argfs*38





16 Años. Cribado Fliar


Antecedentes fliares

Tia MCH. MYH7 val606met

Sintomas

asintomatica. rugby competitivo





Pedigree



Estudio genético



RESULT: POSITIVE


One Pathogenic variant identified in MYH7. MYH7 is associated with a spectrum of autosomal dominant and recessive cardiac and neuromuscular conditions.

One Pathogenic variant identified in SLC22A5. SLC22A5 is associated with autosomal recessive primary carnitine deficiency.

Additional Variant(s) of Uncertain Significance identified.

GENE	VARIANT	ZYGOSITY	VARIANT CLASSIFICATION
MYH7	c.1816G>A (p.Val606Met)	heterozygous	PATHOGENIC
SLC22A5	c.34G>A (p.Gly12Ser)	heterozygous	PATHOGENIC
NEBL	c.1322C>G (p.Ser441Cys)	heterozygous	Uncertain Significance
NF1	c.169G>A (p.Gly57Ser)	heterozygous	Uncertain Significance



SNV





1

MYH7: P12883

Transcript used in protein view: ENST00000355349.4, NM_000257.4 40 exons, 1935aa







Fenotipo evolutivo


15 % INICIO EN LA
ADOLESCENCIA

Marston NA, et al. Clinical characteristics and outcomes
in childhood-onset hypertrophic cardiomyopathy. Eur
Heart J. 2021 May 21;42(20):1988–1996.







MYBPC3:c.2670G>A




MYBPC3:c.2905+1G>A



MYBPC3:c.362del




MYH7:c.1816G>A





MCH Y FENOTIPO



IV.4



IV.5






IV.6




MYH7:c.1816G>A
chr14-23896866 C>T | p.Val606Met | NM_000257.4



RIESGO MSC





Burns C. Multiple Gene Variants in Hypertrophic Cardiomyopathy in the Era of Next-Generation Sequencing. Circ Cardiovasc Genet. 2017 Aug;10(4):e001666



Wang, J. Malignant effects of multiple rare variants in sarcomere genes on the prognosis of patients with hypertrophic cardiomyopathy. Eur J Heart Fail, 16: 950-957.




MYH7




García-Giustiniani D, Arad M, Ortiz-Genga M, Barriales-Villa R, Fernández X, Rodríguez-García I et al. Phenotype and prognostic correlations of the converter region mutations affecting the β myosin heavy chain. Heart 2015;101(13):1047-53

Clinical Phenotype and Outcome of Hypertrophic Cardiomyopathy Associated With Thin-Filament Gene Mutations

Rutledge-Coppin, MD, PhD; Carasso Y, BS, MD; Evans Aubrey, MD, PhD; Shaker Day, MD; Carasso Pessagno, MD, PhD; Francisco Górriz, BS; Rosales-Torres, MD; San Román, BS; Francisco Torroja, MD; Francisco Górriz, MD; Alejandro Magaña, MD; Conrado Pagan, MD; Ali Tariq, MD, PhD; George Obayomi, MD




TNNT2 SURVIVAL ANALYSIS




Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez

MCH Y RIESGO MSC

Gen	Variante	Resultado	Patogenicidad
MYBPC3	NP_000247.2:p.Arg845Gly NM_000256.3:c.2533C>G NC_000011.9:g.47359011G>C	Heterocigosis	Variante de significado incierto (?)
	NP_000247.2:p.Cys566Ser NM_000256.3:c.1696T>A NC_000011.9:g.47363636A>T	Heterocigosis	Variante de significado incierto (?)



Burns C. Multiple Gene Variants in Hypertrophic Cardiomyopathy in the Era of Next-Generation Sequencing. Circ Cardiovasc Genet. 2017 Aug;10(4):e001666



POSICIÓN	GEN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO/ PROTEÍNA	EFFECTO	FENOTIPO ASOCIADO (PATRÓN DE HERENCIA)	INFO EXTERNA	GENO-TIPO	PROF.	CLASIFICACIÓN
15:63044099	TPM1 NM_001018005.2	c.187G>A p.(Ala63Thr)	Missense Variant	- Miocardiopatía dilatada (MIM: 611878; AD) - Miocardiopatía hipertrófica 3 (MIM: 115196; AD) - No compactación ventricular izquierda 9 (MIM: 611878; AD)	rs1064796782 ClinVar ID: 4240741	HET	119/278	3

5 Patogénica 4 Probablemente Patogénica 3 Significado incierto (VUS)

HCM Risk-SCD


Assess risk of sudden cardiac death and need for ICD in hypertrophic cardiomyopathy

Questions	
1. Age?	60 Years
2. Maximum LV Wall Thickness?	18 mm
3. Left Atrial Size?	57 mm
4. LVOT Gradient?	5 mmHg
5. Family History of Sudden Cardiac Death?	Yes
6. Non-sustained VT?	Yes
7. Unexplained Syncope?	Yes




Results

Risk of Sudden Cardiac Death at 5 years
14.18%

ESC Recommendation
ICD should be considered




MCH Y RIESGO MSC



MARON MS, ROWIN EJ, MARON BJ. THE PARADIGM OF SUDDEN DEATH PREVENTION IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY. AM J CARDIOL. 2024 FEB 1;212S:S64-S76.







VARIANTE Y EFECTO



Marian AJ. Circulation Research. 2021;128:1533–1553





VARIANTE Y EFECTO...

Marian AJ. *Circulation Research*. 2021;128:1533–1553



Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez






NUEVOS TRATAMIENTOS. El Futuro Ilego

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



Mavacamten: Mechanism of Action

ValorHC




Mavacamten, a targeted inhibitor of cardiac myosin, decreases the number of myosin-actin cross-bridges and reduces excessive contractility characteristic of HCM. In oHCM, improves LVOT gradient, QOL and physical functioning.

Olivetto et al. Lancet. 2020 Sep 12;396(10253):759-7
Spertus J et al. Lancet. 2021 Jun 26;397(10293):2467

CORTESIA DR ROBERTO BARRIALES

Desafíos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares de origen hereditario. Dr Luis Enrique Gómez


NUEVOS TRATAMIENTOS. Hace rato



Program	Indication(s)	Discovery	Preclinical	Phase 1	Phase 2/3	US Prevalence
Gene Therapy						
TN-201	MYBPC3 HCM					> 115K
TN-401	PKP2 ARVC					> 70K



Miocardiopatía Dilatada




- **PREVALENCIA 1:250-400**
- APARICIÓN TARDÍA DE LA ENFERMEDAD
- INCIDENCIA 5-7/100 000 PERSONAS /AÑO.



MCD Y RIESGO MSC

- FEY $\leq 35\%$
- CF II-III
- TTO OPTIMO
- EXPECTATIVA DE VIDA DE >1 AÑO.



LMNA
FLNC
TMEM43
PLN
DSP
RBM20




MCD Y RIESGO MSC

- FEY ≤ 35 %
- CF II-III
- TTO OPTIMO



•EXPECTATIVA DE VIDA DE >1 AÑO.



DSP FLNC TTN BAG3 LAMINA A/C




LMNA
FLNC
TMEM43
PLN
DSP
RBM20




III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA

LMNA




Barriales-Villa R, et al. The REDLAMINA registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2021 Mar;74(3):216-224.

FEY $\leq 45\%$
TVNS




TMEM43



Hodgkinson Kaet al. Long-Term Clinical Outcome of Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy in Individuals With a p.S358L Mutation in TMEM43 Following Implantable Cardioverter Defibrillator Therapy. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2016 Mar;9(3):e003589.

FLNC




Gigli M, et al. Phenotypic Expression, Natural History, and Risk Stratification of Cardiomyopathy Caused by Filamin C Truncating Variants. *Circulation*. 2021 Nov 16;144(20):1600-1611.


FEY $\leq 45\%$

Ortiz-Genga M et al. Truncating FLNC Mutations Are Associated With High-Risk Dilated and Arrhythmogenic Cardiomyopathies. *J Am Coll Cardiol*. 2016 Dec 6;68(22):2440-2451.

PLN



van Rijsingen IA, et al. Outcome in phospholamban R14del carriers: results of a large multicentre cohort study. *Circ Cardiovasc Genet*. 2014 Aug;7(4):455-65.





Verstraeten TE, et al. Prediction of ventricular arrhythmia in phospholamban p.Arg14del mutation carriers-reaching the frontiers of individual risk prediction. *Eur Heart J*. 2021 Jul 31;42(29):2842-2850.




MCD Y RIESGO MSC

DSP



RBM20



RTG en RM
FEY <45%


Hey TM, et al. Pathogenic *RBM20*-Variants Are Associated With a Severe Disease Expression in Male Patients With Dilated Cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2019 Mar;12(3):e005700

Gen	Riesgo Anual MS	Predictores MS
LMNA	5-10%	LMNA risk score. www. https://lmna-risk-vta.fr/
FLNC	5-10%	RTG en RM/FEY<45%
TMEM43	5-10%	Hombre/Mujer +FEY<45%/TVNS/RTG en RM,>200EV holter
PLN	3-5%	PLN risk score https://plnriskcalculator.shinyapps.io/final_shiny/ RTG en RM/FEY <45%/TVNS
DSP	3-5%	RTG en RM/FEY <45%
RBM20	3-5%	RTG en RM/FEY <45%



MCD Y RIESGO MSC

III JORNADAS DE GENÓMICA CLÍNICA



MCD Y RIESGO MSC

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR



UNIDAD DE CONOCIMIENTO TRASLACIONAL HOSPITALARIA PATAGÓNICA

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE S.A.M.I.C.

Jefe De Servicio: Dr. Guillermo Corró - MP: 329, MN: 11055

Email: diagnostico.molecular@hospitalelcalafate.gob.ar Tel: 02902491831 Int: 4003


GEN	CAMBIO DE NUCLEÓTIDO	CAMBIO DE AMINOÁCIDO	CIGOSIDAD	CLASIFICACIÓN ACMG
RBM20	c.1906C>A (NM_001134363.3)	p.Arg636Ser	Heterocigota	Patogénica



TTN: N2B Isoform (exon 50 – 220)



TTN: N2BA Isoform (exon 107 – 108)



Miocardiopatía Arritmogénica

- **PREVALENCIA 1:2000–5000**
- 50% ARRITMIA VENTRICULAR**




Fig.2. Mecanismo molecular




MCA Y RIESGO MSC

Gen	Proteína	Prevalencia	Fenotipo	Otros fenotipos	ClinGen
Genes desmosómicos					
PKP2	Plakophilin-2	20-46%	MAVD		Definitivo
DSP	Desmoplakin	3-20%	MNDVI, MABV, MAVD	Síndrome de fragilidad cutánea-cabello lanoso (pelo lanoso o hipotricosis, queratoderma palmoplantar)[13]	Definitivo
DSG2	Desmoglein-2	3-20%	MAVD		Definitivo
DSC2	Desmocolin-2	1-15%	MAVD		Definitivo
JUP	Plakoglobin	0-1% (> Naxos)	Enfermedad de NAXOS		Definitivo
Variantes Fundadoras					
PLN	Phospholamban	0-4% (> países bajos)	MAVD	R14del más común, peor en ♀	Moderado
TMEM43	Transmembrane protein43	0-2% (> Newfoundland)		Jóvenes, Varones, arritmia ventricular letal (Newfoundland, Canada)	Definitivo
Genes de Fenotipos solapados					
SCN5A	Nav1.5	2%	MAVD	Solapamiento con MCD, Sme Brugada y QT largo	Limite
LMNA	Lamin A/C	0-4%	MCA	Solapamiento con MCD. Distrofia muscular esquelética. Disfunción del nódulo sinusal y anomalías del sistema de conducción.	Limite
TTN	Titin	0-10%	MCA	Solapamiento con MCD	Limite
FLNC	Filamin C	0-3%	MCA	Predominante izquierda, Distrofia muscular esquelética	Limite
DES	Desmin	0-3%	MCA	Distrofia muscular esquelética. Anomalías del sistema de conducción.	Limite
Genes Emergentes					
CTNNA	Alpha-Catenina	0-2%	MAVD		Limite
CDH2	Cadherin-2	0-2%	MAVD		Limite
TJP1	Tight junction protein 1	0-4%	MCA		Limite
ANK2	Ankyrin-B	0-5%	MCA		Limite




Gen	Riesgo Anual MS	Predictores MS
LMNA	5-10%	LMNA risk score. www. https://lmna-risk-vta.fr/
FLNC	5-10%	RTG en RM/FEY<45%
TMEM43	5-10%	Hombre/Mujer +FEY<45%/TVNS/RTG en RM,>200EV holter
PLN	3-5%	PLN risk score https://plnriskcalculator.shinyapps.io/final_shiny/ RTG en RM/FEY <45%/TVNS
DSP	3-5%	RTG en RM/FEY <45%
RBM20	3-5%	RTG en RM/FEY <45%



MCA Y RIESGO MSC




MCA Y RIESGO MSC





MCA Y RIESGO MSC

Running recreativo
Palpitaciones




DSP c.250C>T (p.Arg84*)


TV-CVE CDI



DSP c.1009_1010dup (p.Leu338Serfs*36)



MCA Y RIESGO MSC



Hoorntje ET. Variant Location Is a Novel Risk Factor for Individuals With Arrhythmogenic Cardiomyopathy Due to a Desmoplakin (DSP) Truncating Variant. Circ Genom Precis Med. 2023 Feb;16(1):e003672.



Mensajes Finales

1. EL **EG** CONFIRMA EL DIAGNOSTICO **ETIOLOGICO**.
2. EL **EG** ES **FACTIBLE Y ACCESIBLE!?**
3. EN **OPORTUNIDADES** ES UN MARCADOR DE **RIESGO** Y DEFINE **CONDUCTAS**
4. LA **INTERPRETACION** DEBE REALIZARSE POR UN EQUIPO **MULTIDISCIPLINARIO**.
5. **MEDICINA TRASLACIONAL**.





Gracias

